

# Park olworski w Petkiniach

Włodzimierz Ceasłowski 1950. r.

Został uznany zaabytkowy piśmem z dnia 21 stycznia 1949. r. L. Ł. S. - 2-6-4-49, numer rejestracji: 18 2P.

Park leży przy drodze Jarostaw - Lerajsk 5. km. od miasta Jarostawa, na ostatnich występach wzgórz lessowych obwołanych do doliny rzeki Lajun. Teren piasisty, gleba głęboki less, w południowej części parku piasista jest na glebie wilgotnej przez chłopców do torfiastych Tłk.

W zupełnie bezlesnej okolicy Parku Petkinijskiego, wciąż jest zalesiony i celowo prowadzony przez lat 50. Stanowi wodnaiernie krajobrazu dzięki piśkiemu nielokom koregującym się z wysokości skarpon na wzniesienie Tłki i na dolinę Lajun, zauknie to linia lasów na trawie.

W połowie XVII. w. Kozłkowie, właściciele miasta Jarostawa i lasów wsi okolicznych, mieli w Petkiniach w okolicznych pałacach letnie rezydencje. Historia Jarostawa ks. Liarsyńskiego wyłożona w połowie XIX. w. wspomina że w onym czasie pałac otaczał park z wolutyskami i stryżonymi szpalerami, a więc nielocem park z wolutyskami i stryżonymi szpalerami, a więc nielocem był wówczas park starannie utrzymany. W późniejszym czasie nie

O parku Petkiewickim nie słychać; właściele tu nie mieszkali a inwentarze z lat 1683 i 1727, opisujące pałac niegdyś nie o parku nie wspominają. Z tych opisów widać bluze zamieszkanie Rydzynki, a parku niewątpliwie wogóle nie było. Dopiero w roku 1890 obrat sobie za rezydencję Witołk Ł. Czartowskiej. Czartowskiej mieli w tradycji zamieszkanie do zakładania pięknych parków. To też nowy właściciel zamierzali dekadolog, przejąwszy się tą tradycją, a zachęcony wyjątkowo pięknym położeniem swej siedziby zabrał się z zapętem do założenia parku. Według własnych pomysłów rozplanował założenie parku, a przez lat pięćdo 50 prowadził go o własną rękę z wielką pracowitością.

Do parku włączono skarpę wzdłuż Tęki i przyległe pola. Starych drzew tutaj było nie wiele. O nich wspomnie przy niegdyś opisie. Tutaj jedynie zasłuchać że na północnym wschodnich stokach rosły lierne okazy wto skie. miaz. egzotycznych rośliniarów. Okolice lasostania i Rydzynki znane są jehese z kraków przechozbionych z liernymi okazy woskich doskonałe kamocych i obficie ro drzewych. Wiciloty w czasie ostrej zimy 1928/9 wypadły przeważnie korony. Wiekami ich 210 kuba nowe korony i wodro obficie, ale wiele z

niekiedy zginęło. Naprawdę piękne drzewa które były  
 wielkie ozdobiły parku dzięki swojemu rozmiarowi  
 i kształtowi. Wianowicie wspaniała lipa i wspaniały  
 wierzba zwalita buza około r. 1936. Rostęcy  
 one na wschód od parku na t.zw. "placyku"

Szeregometry opis parku wedle stanu z roku 1944.

Park Toesy się od wschodu z Tokami porośniętymi  
 Kopkami drzew, które tworzyły z parkiem jedyną  
 krajobrazową całość. Od południowej strony  
 do strony Jarostaw - Jezajsk. Od zachodu i półn.  
 zachodu, konusowy parkiem a południowym  
 północnym przebiegała aleja "maximus per  
 silvanica" sadzona w latach 1890-95; wypro-  
 dukowana z nasion pochodzących z Kónika.  
 Dalej zachodnia strona drogi obrabiana  
 wreszcie wąskim, pochodzącym z M. XII. 29  
 aleją rębki, sadzona około r. 1935 r., dalej  
 od końca okienkami ozdobionego na  
 planie XII aleja lipowa sadzona około r.  
 1895. Lipy te nie tworzyły formnych koron,  
 gdyż w okresie pierwszej wojny nie były for-  
 mowane, około r. 1930 zastosowano silne cięcie.  
 Powstały stół drzewiany, którego drzewa nie  
 mogły zagęścić, powstaje stół obawy, że te  
 namy będą zarobkieni przywrócenia drzew.  
 Na zachód od aleji założono w latach 1922-25  
 sadł jabłoniowy, w odstępach 15m. celem umożli-

liniowa uprawy jarmu. Przy zakładaniu  
 sachu kolektyw w Skarżówce s.p. Wroblewski,  
 ówczesny kierownik zakładów i hotele w  
 Frechowie koło Puelk, wiosni Tow. Gospodar  
 skiego we dworze. Sach ten wywarł w znacznym  
 procentie (80%) w r. 1928. Niektóre odmiany pszen  
 zymaty ciężko ziarno i dość silnie rosły, ale prawie  
 zupełnie nie owocują. Natomiast wiele owocują  
 malinowe oberlandskie i zielone sztetyny. W  
 miejscu zasiewanym na planie zakładu w r.  
 1943 sach sliwkowy w różnej odmianach. Na  
 południe od otwarcia XIX. powiększy się  
 a skarpami założono. W r. 1926 sach sliwkowo-gro  
 nowo, który w r. 1928 wywarł zupełnie. Dalej  
 partie tego terenu aż po zjazd tamiony XX,  
 założono około r. 1925 sachem czereśniowo-wis  
 niowym. Do czasu tej uprawy nie miały widać  
 od swej ciężkiej ziemi, ale ponieważ zbudowały  
 się od wozów rosły silnie i widać zaczęły  
 majęć. Wygląda się że na tutajnych lessach  
 więcej potężnych, czereśnie i wiśnie jak białe  
 owocują wrosły są to wiasne odmiany owocowe,  
 które obficie przespierają. Natomiast nie  
 widzieliśmy na tutajnych lessach widać  
 sachów jabłoniowych. Półg granicy od południa  
 stanowią pola uprawne a także Taki.

Na terenie Tak obwodskich, obszarów nowo w  
 ostatnim 10-letni ubiegłego wieku alej obelony.

obely to tworzyły baroko piękne aleje, były rybko  
a niektóre z nich obchodziły już do ten. pierś  
nicy. Wspominając to aleje obchodzą do wiersza  
to aleja stanowi bardzo piękne drzewo alejowe.

Tworzy prostą pojedynczą straż, nie daje zbyt  
dużo cienia i trochę wosku. Była to jedyna aleja  
obchodzą jako mater. Niektóre nycisto ją w roku  
1945.

Uwaga W dalszym opisie cyfry połączono ochronę nie  
do zatępnionego planu. Cyfry arabskie oznaczają  
pojedyncze drzewa, zaś rzymskie oznaczają ochronę  
stony lub większe skupienia.

Odb nosy celownika park zynoptot grabowy, strzy  
zowy, saksony w kilka rzędów, w roku 1890/95.  
sachonkami mykajnymi z malotów lesnych. W  
roku 1928/9 wymarły on do wysokości pokrywy  
świeżej, następnie ochrokił się w upetności.

- 1/ Po obu stronach bramy wjazdowej rosą 2  
wisy piramidolowe saksony w r. 1890/95
- 2/ Dalej w prawo kilka sztuk juglans cinerea  
z r. 1895/900, owocuje obficie.

I/ W grupie tej znajdują się: piękny buk esenowy,  
jawory, kłobity i wisy, juglans nigra, oraz  
drzewa mieszanicy w celowaniu i drzewy owoc  
z baroko grubo obkopano, zielone tujy,  
okoto 15 m otęgie. Skupienie to otaczają krzewy:  
Lilowia japonica, forsitia, wiburnum petuo  
kwiatowe,

weigelia, kaktusowiec, krew wislii bardzo  
wzrostu o ciuyci kciach ciolucyeh  
biatyci kmiatow i esenowym stolkiem. Tak  
druwa jak pnewasna esot kwenow z r. 1890/99.

4/ Wisnia kulista z r. okoto 1932, ze skotek Sokotow  
k/ Hryja.

II / Gnyja elch, kaktusow z kalios, lehozynq i  
eseremeha w ciolucym okapie z r. 1890/5 topole  
pochodzące ze skotek kowickich z r. okoto  
1930

III / Gnyja na stame, topole z kowicka okoto r. 1930.

IV / kopa byow okoto 1890/5

V / kilka sztuk charnacciparis mutensis i juniper  
us virginiana 1890-95

5/ Acer negundo foliis variegatis 1890/900

VI / Juniperus salicina 1890-900 unkoekone poeis  
skicu u r. 1915.

6/ Wiewla ptaczepa okoto 1930, pochodzi z Hory  
u ad Kollubowa.

7/ Wtqz ptaczepy z r. 1890-5.

Naol stawem kilka starych wiersb, ktore gnuq  
mas kilka wiersb ptaczepych jak 6.

8/ Na gasowie przesol patatem kilka eisow  
stozkowycyeh wyelwolowacyeh u skotec petkini  
skicij z nasienia pochodzącego ze starych  
eisow u parku petkiuskim.

VII / esenowo oszalczona beczowa. klauq, brozy,  
jesioey, buki, grab, eseremehy, jairum, z lat  
1890/5. Wzlotow drogi stame wtqzy, brozy, aka

je. Wzrostu świeży z liptową pełnodziwną kolebką  
koniferów jak: *Thuja varreana*, *evangeliana*, *occidentalis*,  
*Chamaecyparis plumosa*, *lanceolata*, *pisifera*,  
*isa*, *eisy*. *Persea* *laetovirens* a *patacea* w dol-  
ku brzośnie, *quercus rubra*, *sessiliflora*, lipy, *inglans*  
*cinerea* / z włośnego nasienia dol 2/ sasko nie ja-  
ko stawa olchowa. 1928-32, oras *pernitia*, *hes*,  
*siriuga josikea*, *philadelphus*.

9/ *Thuja* *pacifica* 1890/5

VIII / Grupa koniferów: *Juniperus virginiana* poś-  
ród *Chamaecyparis pisifera*, *Thuja* *evan-*  
*geliana*, z r. 1890-5. Konifery które wymarły  
w r. 1938/9 szeregowo sasko: *Thuja varreana*,  
*Taxus haccata* i *taxus*.....?

10) *Magnolia hypoleuca* lub *acuminata*? / ohi-  
ze liście, kwitnie na konarach pól, kwiat nie  
kolorowy, owocuje / r. 1928-32, z nasienia bel  
*Raffna* z kopenhagi.

11/ *Cladonia* *lutea* okoto. r. 1935. z nasienia  
od *Raffna*.

12/ Bzy różne z kominika. okoto 1930-3

13/ *Magnolia* *colus borealis* okoto r. 1935

14/ Klony kuliste / igoly nie strzyżone / 3 kłaki  
1890-5.

15/ *Picea* *gledicia* okoto 60cm. pierśnicy, obfi-  
cie kwitnie, nie owocuje las ziemni 1890-3

IX. / Wzrostu mumi oporowego, z wyrostek ciłomia  
*japonica*, z włośnego nasienia r. 1930-34

16/ *Picea pungens* *Kosterii*, srebrny świerk okoto  
1937.

- 17/ Kłopot brzoś, białe pińce, olwa starna sprawa  
okone, utocnie pochodek z ocholi konewionych  
pienwylu.
- 18/ Na breszeie pagórka kilka lip z v. 1890-4. wśród  
nich lej od granatu z v. 1915.
- 19/ Brzoza z v. 1890-5, na niej pińce się tus radicans  
z v. 1930-4
- 20/ Quercus rubra z v. 1890-900
- X/ Grupa cuniperus communis, pochodek z  
Poznańskiego 1890-95, pochodek acer pal  
matum / Takowicem ? / 1930-4
- 21/ Jesien piackoy 1890-5
- 22/ Lophota japonica, z nasiewa od Raffina  
1931-4
- 23/ Acer negundo folis variegatis około v. 1910  
na nim pińce się tus radicans. 1930-5.
- 24/ Grupa g / Jesienów na nich pińce się: blunus,  
liguonia / teoma / vitis, ampelopsis.
- 25/ Catalpa speciosa / Wilkowiata / 1890-95
- 26/ -" - -" - z nasiewa z poprzedniej  
1926-31
- 27/ Magnolia leato kintucea 1934-6.
- 28/ Kilka jalteni różowo-kintucegek v. 1929-32  
skłotki loketón.
- 29/ Fraxinus monophylla v. 1900-4
- XI/ Stok obsadkowy jaltowcem z Poznaniańskiego  
1890-5, oras thina elvangeriana i varredna  
1920-6. elotem obwódka Malouia, wernatiz  
pioteky elob z v. 1890-5. oras stara krywa,

losna sprzed 1890.

30/ *Ulmus latifolia argentea* 1925-8.

XII. Buxa, grab, jesion amerykański, wzrost drogi  
uzupełowej 2000 tuji. W górnym części od figury  
łlatki Boskiej olwa jesionu złoty uakrapia  
mymu liściem /aucubifolia/ i różowo kinstuce  
akacje. Od strony terasu: perukowiec, cali  
cautus, olezia, jasionie, prunus, trilolia, sy  
tuga josiaka, liś, krzewy głusone przez olwa  
na wspaniale odlatująca.

31) Cisy strzyżone z r. 1890-4. W r. 1928/9 silnie  
przymarły następnie odrosły się, rodek  
powoju /olwa olfice.

32/ Trawa eulalia zebrina 1928-33

33/ Kowier belumowo rosny 1934-6

34/ *Chamaecyparis* o psolach złotych, ptaeracych  
1933-6.

35/ Trawa eulalia mistriata 1928-33.

36/ *Dehesyna cernona* v. 1909-13. W r. 1928/9 kwier  
wymarły, wypuścił z korzeni na nowo. Rośli  
olwa owoc, z których siewki mają liście  
zielone nieco ciemniejsze od imierajnych.

37/ dypa z r. 1890. lub Starna, wzrost staly.

38/ *divicledon tulipifera* oraz platan olwa  
r. 1930-33.

XIII. / jako tto do figury ul. Boskiej, tuga caua  
oleusis, abies normanliana, magnifica,  
pectinata.

39/ *Dwie sophera japonica* piaczące, koto figury

2 nasienia nie rozpięte  
40/ Pinus 2 elongatum jasnym i pilkami /exelsa?/  
1930-6

XIV / Drzewostan z r. 1890-95 mieszcący, około  
r. 1923 silnie przetrzebiony, drugą trzebierz  
przeprowadzona w r. 1943. Stół, wnie gólcie  
jesienią odznaczają się silnym wzrostem  
i dużymi jałkami na swój wiek odumiaromii.  
Jesion, klon, grab, dąb przy obrotach w  
zł. z przed r. 1890. Dąb w obrotach obrotach  
w tym samym wieku co drzewostan panu  
jęcy. Około r. 1927. drzewostan podlegał  
cisni pochodzący z nasienia zebranych  
w parku, jutowcu spróchniałym z Por  
udzielnego, wleze tylko /clafie meserium/  
z lasów Pałacu, w mied kopułki, przy  
laniska, kowalce, rownie z lasów z Pa  
lu, oraz liluse. Sienki ciś z naturalnego  
malotu.

41/ Wierz z liściem mało uakrapianym /ameryka  
liski / 1890-5

42/ Juglans nigra 1890-5. Przewodzący z  
nasienia pochodzący z parku w Krasiecyne  
koło Poskuyła. Egzemplarz rosnący w górnej  
części drzewostanu przy skrzyżowaniu Sie  
żek, odznacza się gęstym wzrostem i obficie  
owocuje.

43/ Jesien z liściem 2070 uakrapianym 1890-900,  
wymaga ochrony przed szkodnikami.

XV. / Dzewostan uienany z r. 1890. *Pinus silvestris*,  
 strobilus, jesienn, obob, grab, gledicja. beregołwie  
 piśkne chasy jesienn i gledicje u obobnej ersej.  
 Oboba ktora była też tam saskona, zostata um  
 nioto u latach 1904-8, golyz najnybeiej rasnoe gtu  
 była etoeseenie. W tym okresie musiano oebra  
 niac oboba przed zapłucheniem przez sosny i  
 jesienn, poniewaz to porostat we wroscie w tyle  
 pora snym etoeseeniem. Jedynie grupa obobow  
 cel strobny potudeniowej oboba do stosunkow  
 chwyeli rozmiarow chwyki silneemu przeszedzeniu  
 w r. 1912. W obobnej zachodniej ersej dzewostanu  
 wysadkono w r. 1930-4 sophora / nasienne cel  
 Raffia / juglans nigra i cinnerea / nasienne wa  
 snego zliomu / pinus salicifolia, oras krzewy:  
 lucyca, kalina petna, eleuzia, exalorala, gra  
 meliflora / nasienne cel Raffia, rozne colunia  
 ny spisei, cinnis, ailactus, glauoluzsa.

W wielu miejscach dzewostanu podniewka  
 lechyny i ererupla. W potowie stromy potu  
 chwyonej luyliuy: twaty lubia, solidago, hene  
 ego.

44 / *Thuopsis oblobrata*, data posadzenia 1934  
 - 7.

45 / *Tsuga canadensis* 3 sztuki data sadzenia  
 1934-5 / Raffia

46 / *Acer ginnala*

47 / *Phelodendron amurense*, khotki Lakoton  
 skie, saskony 1927-30

48/ Dwa obłuy piraamidalne. Saskone 1925-8.

49/ Liriodendron tulipifera, saskone 1926-30

XVII/ Przestrzeń ta jako pole została obsadzona  
 świerkiem i pojedynczymi bukami w v. 1890.  
 Zachowała zaś jej część w tym samym obsze-  
 dzie chlewnymi liściastymi: jesionem, klonem,  
 grabem, osiką po parciu, starą obrogą, kłosem  
 w późniejszej części stało sosna, chorąg.  
 Świerk po 25 latach opadnięty przez koru-  
 ka sechł masowo. Wobec tego od v. 1924 usu-  
 wano stopniowo świerka i podsadzano chle-  
 wiatami jodłami poszlowskimi i lasów liściastych  
 pow. Nisko, oraz zotkalską i bukami z lasów  
 z Łańca. Świerka po kilku latach mniej-  
 szej części. Pozostały z pozostałości mniej tego  
 świerka, pojedyncze buki i jodła sosna.  
 Zaliczony wspaniałym saskodukami ma-  
 kanta zmyślonego i leptolepis, pieca, alba,  
 jaworu, oraz kucik nie elifity malet jesionu  
 brzozy i kłosa, a przy aleji lipowej malet  
 lipy. Wzrost jesionu najpóźniej główny swe  
 odcienie, przeprowadzanie trzelnicy, leonie-  
 erne.

W czasie chwatań wejmujących w v. 1915 wyco-  
 panie świerczyny parciu aleję a sełską  
 w południowej części chlewniatami. Przestrzeń  
 to chlewno koncesyjnymi z własnej  
 starszej niż lipami, jesionami, kłosami,  
 obłami.

6. XII. 3. g.

Wenigst dnerostam majduj sje dnie abies nor  
maniana, nespiciuj licha z ogromnym lišćem.  
a przy šieiee wje o csemoujeli lišćach.

Póttocny kraj dnerostam edl Taki obščasny  
kolekcy koniferow: retinopora, eliamacciparis,  
lansouana, pidifera, plimus abies arisonica, zasa  
dšoue tam - bilka ntak sequoia gigantea, wyua  
wry zupetnie. Penubdy koniferowu catalpa spe  
ciosa z wřamgo nasiecia i acer lasiocarpa. Za  
elueclia lišćasta esie dnerostam poščadšona  
połto, a krajem pinus exel sa.?

XVII/ kótko w dnerostanie xī zasadšone waelko  
wórazim 1890-5, wzrost b. staly, wiele wysycha,  
przy wórazach poračkowa aristolochia  
1925-33. teš stálo rošenie, nie pwe šie.

50/ lloclnow /pelowice?/ wzrost staly, šilnie  
šroenje 1890-00.

XVIII. / W kelle elphy z v. 1890

51/ Na Tpe juniperus salina z v. 1890 šetš  
30m. šreclivy.

52/ Picea pungens argentea i 3 juniperus sa  
lina kabica 1932-5.

53/ Cercidiphyllum japonicum 1925-32

54/ Thuopsis elobrata 1931-6

55/ Gynochaelus canadensis, nasiecie ed  
Raffua 1928-35

56/ Quercus elobow amerykańskieli 4 tem.  
ladettei 1890-98

/Penylova kolejnišé 49, xvii. xvi. 50. xviii./



XXV. / Drzewostan mieszanym: lelek, jesion, grab, osika, kalina, eserechla, leweryud. Lesie potrudniowa porowaga jesiowa, potrudniowa - lelek i grab.

59 / Palisada 1890-5

60 / Pinus austriaca 1890-5

61 / Liliaceae tulipifera, 2 nasienie od Roffua 1926-33.

62 A / Alnus cuneata lasiocarpa grupa nasienie od Roffua 1926-33.

63 / Juniperus sabina, nasienie wlasne 1929-35

64 / Bulb eserechly spirochloey w 2 chaciej nkoTKi okolo 1930.

XXVI. / Skarp wystawa uschodnia. Splaetowany na tarasy wielke tradycyji z potrudniem 194, celem uokielenia zarobku w czasie gubelu i latwienia wumicy. W tworej glinie terasy / stopnie / dobrze zachowane. Gasto zarosla, leweryud, trawielina, pojedyncze oszechy woskie / wzrost ich staly, owocuj wysle / oltiem stare wozu, pojedyncze grube i jablecne, jesiony. Drzewa oplesione chikim wicem i solanum. Na dolnej lewicy stare wodroce oszechy woskie. Od potrudniowa akacja.

65 / Grupa lip, reserpicum w kilku columnach przeswawie srebrnolistne rozucej kwituce o lewicytych kwiatkach 1890-5. Najwiecej elwana listowate z tego esasu do lue. pierwsicy.

66 / Kilka dagledii w roznych columnach, najwiecej do lue. pierwsicy. Ne wiej quiesclitly

- \* się kniuki w 1942. r. Najmniejsza okładka się  
 grubo, konkomę korę. Laskane w r. 1890-5
- 67/ *Felocleuscha americana*, kłótki Lokotowskie  
 2 v. 1927-31.
- 68/ Grupa liuków esenowych 2 uariem od Raffua.  
 2 tyki uariem uryskało około 25% liuków  
 esenowych, kłótki kłomowietne 1927-34
- 69/ dnieki, chmentka pasachene w r. 1890. Od koregu  
 lat owocuj.
- 70/ Grupa grama brzoś, podnycie leneryna, Pows  
 stoty 2 chment. uichnawego /graby/ kłótki  
 uuniofo 1926/ 1890-900.
- 71/ Grupa ~~brzoś~~ grama suchym w górkach las pod  
 brzoś  
 nycia, wzrost staly 1890-900.
- 72/ Jawor o liściach od spodu pioletowych  
 1926-35
- 73/ Wzrost piersocy 2 uasnej kłótki 1929-35
- XXVII. kłom, jawory, woz, jesiency, grab, lenery  
 ucy 1890. Stary woz na Seieśce.
- 74/ Jesion piersocy 2 kłótki 1900-5
- 75/ Grupa elerui, olpicie owocuj. 1900-5
- XXVIII. / Olchy 1904-7, topole 1924-7, Polygomonu  
 sachalinense, Galactus uivalis
- 76/ *Taxodium distichum* 1928-34 uariem od  
 Raffua.
- 77/ Topola wielkolistna 2 kłomika. Nie ola  
 się uunioyé ani przez kłótki ani przez  
 kłomowietne 1926-29
- 78/ *Conillus colubina* 2 uasenia. 1926-30 zaro