

do tych Zaliczono: as tyż asymilow
w petri występuje w zapachowa
warstw opactwa w Tyrycu. Ochronny
zespół relikwiarz hłentowych zespół
najmniejszej ~~nie~~ dostępny fragment
pierzchni wyznosił ^{2235 m w pionie} 10 stron
złocistych, wchodzących: potężnych
i uwiastych, słabych i ciemnych od
strony wiast. Generalnie brzytliwi
i lżejsze ^{złociste} zespoły wchodzący części
platformy, pręgi i naciąg ~~platformy~~
~~siatki~~ i perowem ^{i naciąg} przez które
przechodzą drogi lub przepięcie
wieloletniej oraz wjeżdżają do hłentowej opactwa.
~~Wschodniej części zespołu znajduje się długi i ciemny~~
~~zespół relikwiarz hłentowych~~ Ochronny zespół
~~złocistych i ciemnych~~ ^{złocistych} ~~złocistych~~ ^{złocistych}
~~złocistych i ciemnych~~ zespół górny zajmujący
wschodnie i potężne złociste wjeżdżają
hłentowego, zwracając uwagę na
opóźd dolny występuje na wschodzie

[illegible]

TC-OK-7-64

ptan

Opactwo Tymienie zajmując wyjątkowo
wysokie, skaliste, opadające urowiślemi
ku wiśce, Alzaj

Opactwo Tymienie zabudowane jest
na platformie ~~opadającej~~ tego samego
skalnego, opadającego urowiślemi
ku wiśce oraz strumienia obokami.
W porostach liśnianych. Orosobol
my liśnaty wysoki i ^{regulowany} ~~tego regulowany~~
jęszościów petrdinacji i uścisłach
pasmach przynajmniej o ~~tego~~ ^{regulowany} ~~strumienia~~
uścisłach i wianach tych strumienia.
Orosobol zabudowany nie jest w ~~prosto~~
opadającym do 80-100 m

Każde laboratorium charakteryzuje się elastycznością swego urządzenia ,gdyż wszystkie podstawy pracy /stoły / wysokie czy niskie są ruchome będąc wykonanymi ze zwykłych szkieleatów z rur stalowych ,pokrytych płytą lawy / ? / emaliowanej .

N odwrót - stałe są wszystkie przewody instalacyjne to jest woda,gaz,sprężone powietrze ,ciecze pod ciśnieniem ,moc i światło elektryczne i kanalizacja.

Ssą także również są kraty pozwalające na łatwe montowanie aparatury. ”

Odmianę tymianek zalewne rosnące
w tradycji w miejscu, gdzie był ożóg
gród rodu ^{skarów} Toporczyków. ~~z wyjątkiem~~
Jest to wyjątkowo wyjątkowo ^{ok. 250 m n.p.m.} odmiana
przebiegająca w kierunku północnym lub wschodnim,
leżącej ^{od strony} południowej w kierunku południowym
wzrostu jego potężności zbioru, oddzielając
je od sąsiedniej ^{rośliny} odmiany, Grodziska.
ok. 282 m n.p.m. gdzie mieszczą się w całości
południowym ^{składowym} kierunku. Od północy
wzrost tymianek. sąsiednia z górą, wzrost
winnicy (250 m n.p.m.) o

TC-OK-7-64

Winnica